

Ficha Técnica de producto

Natupol

Bombus terrestris | Abejorro común

- Colonia estándar de abejorros para uso en cultivos protegidos
- Con impresión Beevision
- Con puerta Beehome
- Con aislamiento de nido



Objetivo

Natupol se puede utilizar para una amplia gama de cultivos, cultivados en superficies mayores de 2000 m² y con aproximadamente 25-35 flores por m² por semana.

Usar para

Cultivos

Tomates redondos, vacuno, pera y otros cultivos hortícolas o frutales.

Como funciona

Modo de acción

Tras la introducción de la colmena, las obreras comienzan a polinizar las flores y al mismo tiempo recolectan polen para alimentar a las crías. En las semanas posteriores, las crías se convierten en obreras, aumentando tanto el tamaño de la colonia como el rendimiento de la polinización. Después de algunas semanas, la colonia alcanzará su tamaño máximo y comenzará a disminuir en tamaño y actividad de polinización. Su desarrollo depende de las condiciones ambientales y de la cantidad y calidad del polen.



Bombus terrestris

Especificaciones de producto

Presentación

Una colonia de abejorros (incluyendo una reina, obreras y crías) y agua azucarada.

Tamaño de la colonia

Extragrande, contiene 80-110 abejorros de introducción.

Actividad de polinización óptima

5-7 semanas.

Volumen de agua azucarada

1.6 litros.

Aislamiento

Aislamiento en la parte inferior del nido que permite que los abejorros mantengan una temperatura adecuada incluso en temperaturas bajas.

Ventilación

Aberturas de ventilación estándar.

Impresión Beevision

Equipado con impresión Beevision, para proporcionar orientación a los abejorros en cultivos.

Puerta de la colmena

Equipado con puerta Beehome para recoger abejorros en los casos en los que haya que retirar temporalmente abejorros o colmenas.

Instrucciones de uso

Aplicación

- Coloque la colmena en un soporte elevado horizontal (evite la inclinación, de lo contrario puede salir el agua azucarada)
- Coloque la colmena a unos 20-60 cm sobre el suelo a la sombra del cultivo o, si es necesario, proporcione sombra adicional
- Abra las aberturas de ventilación en la parte superior de la colmena durante el clima cálido
- En condiciones de días cortos (<10 horas de luz), coloque la colmena cerca de la parte superior de las plantas, de tal manera que la colmena esté expuesto a la primera luz del día
- Espere por lo menos 15 minutos después de colocar las colmenas antes de abrir la entrada de la colmena, esto permite que los abejorros cálmate
- Tire de la puerta corredera blanca de la colmena hacia arriba hasta que se vean dos aberturas (entrada y salida). No retire la pequeña puerta gris debajo de la tapa
- El rendimiento y la duración de la polinización varían según el cultivo y dependen de las condiciones ambientales. Consulte siempre a un Asesor de Koppert o un distribuidor reconocido de productos Koppert para asesorarte sobre la mejor estrategia para tu situación



[Ver el vídeo de la aplicación de Natupol](#)

Condiciones ambientales

Natupol funciona mejor a temperaturas ambiente entre 12 y 30 °C. Preste atención a los consejos sobre las mejores prácticas en condiciones de luz artificial o en ambientes calurosos.

Efectos secundarios

Los plaguicidas pueden tener efectos (in)directos en las soluciones biológicas. Consulte [aquí](#) qué plaguicidas tienen efectos secundarios en este producto o en la app SideEffects (Apple Store y Google Play).

Manejo del producto

Plazo de almacenamiento después de la recepción

Para garantizar los mejores resultados de polinización, utilice la colmena en el momento de recibirla. Si es necesario, la colmena puede almacenarse máximo un día.

Temperatura de almacenamiento

15–25°C.

Condiciones de almacenaje

Mantenga las colmenas en un ambiente bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Higiene

- Nunca mueva una colmena de un invernadero a otro
- Retire las colmenas de abejorros como máximo 10 semanas después de la introducción
- Limpie el soporte de la colmena antes de colocar nuevas colmenas

Desecho

Selle las colmenas viejas en bolsas de plástico durante aproximadamente 2 semanas. Después de este período, deseche las colmenas de acuerdo con la legislación local.

Notas

Para más información consulte nuestro [canal de Youtube](#).

Declaración de responsabilidad

Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V. y/o de sus empresas afiliadas). Utilice únicamente productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales. Koppert no se hace responsable del uso no autorizado. Koppert no es responsable de ninguna pérdida de calidad si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado y/o en condiciones incorrectas.